



German Breast Group

Kontakt

German Breast Group

Publikationen (4)

von Minckwitz G, Blohmer J, Huober J, Hauschild M, Fehm T, Müller B, Denkert C, Loibl S, Nekljudova V, Untch M, German Breast Group, Kunz G, Jackisch C, Gerber B, Eidtmann H, Rezai M, Fasching P, Tesch H, Eggemann H, Schrader I, Kittel K, Hanusch C, Kreienberg R, Solbach C, Arbeitsgemeinschaft Gynäkologische Onkologie–Breast Study Groups. Neoadjuvant chemotherapy and bevacizumab for HER2–negative breast cancer. *N Engl J Med* 2012; 366:299–309.

von Minckwitz G, Kaufmann M, Mehta K, Loibl S, Jackisch C, Costa S, Huober J, Gerber B, Hilfrich J, Eidtmann H, Hanusch C, Vogel P, Kümmel S, German Breast Group. Neoadjuvant vinorelbine–capecitabine versus docetaxel–doxorubicin–cyclophosphamide in early nonresponsive breast cancer: phase III randomized GeparTrio trial. *Journal of the National Cancer Institute* 2008; 100:542–51.

von Minckwitz G, Kaufmann M, Mehta K, Loibl S, Jackisch C, Costa S, Huober J, Gerber B, Hilfrich J, Eidtmann H, Hanusch C, Vogel P, Kümmel S, German Breast Group. Intensified neoadjuvant chemotherapy in early–responding breast cancer: phase III randomized GeparTrio study. *Journal of the National Cancer Institute* 2008; 100:552–62.

von Minckwitz G, Kaufmann M, Mehta K, Loibl S, Skacel T, Vescia S, Grasshoff S, Jackisch C, Costa S, Huober J, Hilfrich J, Gerber B, Eidtmann H, Eiermann W, du Bois A, Kümmel S, German Breast Group. Pegfilgrastim +/- ciprofloxacin for primary prophylaxis with TAC (docetaxel/doxorubicin/cyclophosphamide) chemotherapy for breast cancer. Results from the GEPARTRIO study. *Annals of oncology : official journal of the European Society for Medical Oncology / ESMO* 2008; 19:292–8.

Projekte (0)

Keine Resultate gefunden.

Kantonsspital St.Gallen

Rorschacher Strasse 95

CH-9007 St.Gallen

T: +41 71 494 11 11

support.forschung@kssg.ch